


Основаниями для подозрения на ВГП являются:

- падеж птиц на птицефабриках более 0,5 % в день от поголовья птиц, содержащихся в одном птичнике;
- наличие у птиц клинических признаков и (или) патологоанатомических изменений;
- выявление ВГП в хозяйстве, из которого ввезены птицы, инкубационные яйца, эмбрионы, сперма птиц, иная продукция



Диагноз на ВГП считается установленным если:

выделен и идентифицирован возбудитель;

выявлена РНК, специфичная для возбудителя.

Агентство ветеринарии Ульяновской области



Обо всех случаях заболевания и падежа животных и птицы, об обнаружении трупов диких животных, включая птиц, сообщать на «горячую линию» Агентства ветеринарии по телефону **+79297918412**



Памятка по профилактике и ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц (ВГП)



ВГП – высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения яйцеобразования.

Клинические признаки - снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Характерными патологоанатомическими изменениями являются кровоизлияния в подкожной клетчатке, слизистых и серозных оболочках, головном мозге, паренхиматозных органах, застойная гиперемия в органах и тканях.

В большинстве случаев проникновение вируса происходит с кормами, водой, подстилкой, дикой и синантропной птицей, грызунами, транспортом и персоналом предприятия.

Ключевым фактором, оказывающим влияние на возникновение и распространение ВГП является сезонная миграция диких птиц.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- извещение владельцами животных в течение 24 часов ветеринарных специалистов о случаях заболевания или гибели восприимчивых животных;
- соблюдение режима работы закрытого типа;
- недопущение торговли птицей и продукцией птицеводства в несанкционированных местах;
- выполнение требований ветеринарных специалистов в хозяйствах всех форм собственности противоэпизоотических мероприятий;
- использовать для кормления птиц корма, прошедшие термическую обработку.

При подозрении на ВГП руководителю учреждения ветеринарии

в течение 24 часов необходимо

- ➔ проинформировать руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области,
- ➔ главу муниципального образования,
- ➔ население муниципального образования,
- ➔ определить количество птиц.

При установлении диагноза на ВГП радиус эпизоотического очага должен составлять не менее 5 км от границ хозяйств;

- территория прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет от 5 км до 10 км от границ эпизоотического очага - угрожаемая зона;

- территория прилегающая к угрожаемой зоне, радиус которой составляет от 10 км до 100 км от границ угрожаемой зоны- зона наблюдения.

Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 21 день после уоя последней птицы, за исключением дикой птицы, находящейся в состоянии естественной свободы.

